

# OCUhyal C

Natriumhyaluronat 1,2 mg/ml

Augentropfen, Lösung

## 1. Was ist OCUhyal C und wofür wird dieses verwendet?

OCUhyal C sind sterile Augentropfen mit feuchtigkeitsspendender und beruhigender Wirkung, die besonders für empfindliche Augen sind. Durch den Gehalt von Hyaluronsäure (einem natürlichen Bestandteil der Augen und anderer Körperteile) verschaffen diese Augentropfen ein lang andauerndes Wohlgefühl und wirksame Linderung bei gefühlter Trockenheit, beim „Brennen“ und Ermüdung der Augen

OCUhyal C Augentropfen sind außerdem mit natürlichem Calendula-Extrakt angereichert, der schützend, entzündungshemmend und regenerativ auf das Epithel des Auges wirkt. OCUhyal C enthält keine Konservierungsstoffe oder antimikrobielle Zusätze, weshalb diese Tropfen auch für Menschen mit empfindlichen Augen und Kontaktlinsenträger bestimmt sind. OCUhyal C Erwachsene, Jugendliche und Kinder verwenden.

OCUhyal C ist zur äußerlichen Verabreichung ins Auge vorgesehen. Es dient als ergänzende Therapie bei geringer Produktion von Tränenflüssigkeit, bei Zuständen gefühlter Trockenheit und Fremdkörpergefühl im Auge, wie auch bei ermüdeten oder gereizten/„brennenden“ Augen. OCUhyal C wird auch zur Unterstützung des schützenden Tränenfilms auf der Hornhaut und der Bindehaut des Auges verwendet. OCUhyal C kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewandt werden.

## 2. Was Sie vor der Anwendung von OCUhyal C wissen sollten

OCUhyal C darf nicht verabreicht werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder anderen Inhaltsstoffen vorliegt. Bei gleichzeitiger Verwendung anderer Augentropfen sind OCUhyal C als letzte zu verabreichen und zwar mindestens 5 Minuten nach der Verabreichung der vorangehenden Augentropfen. Ihr Arzt sollte stets über sämtliche Arzneien informiert sein, die Sie gegenwärtig einnehmen, bzw. noch vor kurzem eingenommen haben oder erst einzunehmen beginnen — ungeachtet dessen, ob diese verschreibungspflichtig sind oder nicht. Wenn Sie auch andere Augenpräparate verwenden, zu besprechen sie deren Eignung für eine gleichzeitige Verabreichung mit Ihrem Augenarzt.

## 3. Anwendung von OCUhyal C

Sofern nicht anderweitig vom Arzt bestimmt, wird das Mittel 1-3x täglich jeweils ein Tropfen in den Bindehautsack geträufelt. Es ist jedoch auch eine häufigere Verabreichung möglich. Bei Kindern bestimmt die individuelle Dosierung der Arzt. Das Produkt kann sowohl von Erwachsenen, Jugendlichen, wie auch von Kindern verwendet werden.

## Gebrauchsanleitung



1. Die Plastikflasche mit Verschluss aus der Papierverpackung herausnehmen.



2. Vor der ersten Verwendung den Sicherungsstreifen des Verschlusses entfernen.



3. Schutzkappe des Verschlusses abnehmen



- Den Kopf ins Genick legen, die Plastikflasche umdrehen (Boden oben) und mit dem Zeigefinger vorsichtig am unteren Augenlid ziehen, die vorgeschriebene Zahl von Tropfen eintröpfeln und langsam das Auge schließen, damit sich **OCUhyf C** gleichmäßig über die Augeroberfläche verteilt

Während der Anwendung darf die Spitze des Tropfers weder das Auge noch die Wimpern. Nach dem Eintröpfeln des Mittels den Schutzverschluss wieder auf den Flaschenoberteil aufsetzen, damit eine etwaige Kontamination der Tropferspitze vermieden wird.

#### **Hinweis zur Anwendung:**

Vor der ersten Anwendung wird empfohlen durch leichtes Drücken der Flasche einen Tropfen zur Probe außerhalb des Auges abspritzen zu lassen. Für den weiteren Tropfen die Luft wieder in die Plastikflasche „einsaugen“ lassen, damit diese wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt und die Verabreichung ins Auge auf die empfohlene Art und Weise fortsetzen.

#### **Hinweis:**

Unmittelbar nach der Verabreichung kann die Sicht verschwommen sein und so raten wir für cca. 20 Minuten von der Lenkung von Kraftfahrzeugen, der Bedienung von Maschinen oder von Höhenarbeiten ab. Bei zufälliger Einnahme des Mittels durch Kinder einen Arzt kontaktieren.

#### **4. Mögliche Nebenwirkungen**

Selten kann es unmittelbar nach der Anwendung zu einem leichten und vorübergehenden brennendem Gefühl kommen. Es kann auch zu einer allergischen Reaktion kommen. Das etwaige Auftreten solcher unerwünschter Nebenwirkungen oder anderer ungewöhnlicher Wirkungen bitte dem Arzt melden.

#### **5. Inhaltsstoffe von OCUhyf C**

Natriumhyaluronat 1,2 mg/ml

Hilfsstoffe: Calendula-Extrakt, Natriumchlorid, Natriumacetat, Natriumzitat, Kaliumchlorid, Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid und Wasser zur Injektion

#### **6. Aufbewahrung von OCUhyf C**

Bei Temperaturen bis 25 °C aufbewahren.

Vor Kälte und Frost schützen.

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Mittel nicht mehr nach dem auf dem Schild/der Schachtel (beim „Sanduhrsymbol“) angegebenen Ablaufdatum verwendet. Das Ablaufdatum bezieht sich auf den letzten Tag im jeweiligen Monat.

Geöffnete Verpackung binnen 3 Monaten aufbrauchen.

**Packungsgröße:** 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriškova 11, SK-821 05 Bratislava,

Slowakische Republik

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

E-Mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



2265



**Datum der letzten Textrevision:** Juli 2016