

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

SENSIVIT®

Carmellosum natricum (karmellóz-nátrium) 3 mg/ml Oldatos szemcsepp

Gyártó:

UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Bratislava, Szlovák Köztársaság

Jellemzők:

A SENSIVIT® nyugtató és nedvesítő hatású készítmény. Az oldat a könnyfilm mindhárom rétegét stabilizálja a szemfelszínen. A SENSIVIT® karmellóz-nátriumot tartalmaz, amely tulajdonságainak köszönhetően a szaruhártyán és a kötőhártyán ideiglenes könnyfilmet képez, és ez megfelelő nedvesítő hatást vált ki. A SENSIVIT® stabilizálja a könny vizes rétegét. A SENSIVIT® A-vitamint tartalmaz, amely fokozza a könnyfilm belső, mucin rétegének képződését. Az E-vitaminnal együtt javítja a szaruhártya és a kötőhártya tápanyag-ellátását. A készítményben található anyagok erősítik a könnyfilm külső lipid rétegét is.

A SENSIVIT® készítmény a csökkent könnytermelés és orvosi javallatra a száraz szem szindróma minden fajtájának kiegészítő gyógyítására szolgál. A SENSIVIT® készítmény minden olyan esetben alkalmazható, amikor a szaruhártya és a kötőhártya védelmét ellátó könny termelésére vagy a nedvesítő filmréteg erősítésére van szükség.

A készítményt felnőttek, fiatalkorúak és 2 évesnél idősebb gyermekek használhatják.

Ne használja a készítményt:

A SENSIVIT® készítmény használata nem ajánlott abban az esetben, ha túlérzékeny a hatóanyagára vagy valamelyik segédanyagra. A készítményt nem használhatják terhes nők és szoptató anyák. A SENSIVIT® 2 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Amennyiben egyéb szemészeti készítményt is alkalmaznia kell egyidejűleg, legkevesebb 5 perc teljék el az egyes készítmények alkalmazása között.

Alkalmazás:

Amennyiben az orvos másként nem rendel, általában a kötőhártyászsákba kell cseppenteni 1 cseppet, naponta 1-3 alkalommal. Gyermekeknél az alkalmazást az orvos egyénre szabva írja elő. A készítményt felnőttek, fiatalok és gyermekek 2 éves kortól egyaránt használhatják.

Felbontás után a készítmény készen áll az alkalmazásra. A beteg lecsavarja a védőkupakot, kissé hátrahajtja a fejét, a kis műanyag flakont aljával felfelé fordítja, és a flakon összenyomásával megfelelő számú szemcseppet csepegtet az alsó kötőhártyászsákba. Kérjük, figyeljen arra, hogy a cseppentő ne érjen sem a szeméhez, sem a pillájához. Végül szorosan tekerje vissza a kupakot, hogy megelőzze az oldat esetleges szennyeződését. A flakont függőleges helyzetben tárolja.

Figyelmeztetés:

Közvetlenül az alkalmazás után előfordulhat homályos látás, ezért az alkalmazást követő 20 percen belül tartózkodni kell a gépjárművezetéstől, a gépek kezelésétől és a nagy magasságban végzett munkától.

A készítmény használatával egyidejűleg nem lehet lágy kontaktlencsét viselni. A kemény kontaktlencsét cseppentés előtt ki kell venni és csak 20 perc elteltével visszatenni. A készítmény rendeltetészerű használata esetén gyakorlatilag kizárt a túladagolás lehetősége. Ha gyermeke véletlenül fogyasztana a készítményből, forduljon orvoshoz.

Lehetséges mellékhatások:

Ritkán előfordulhat, hogy a készítmény közvetlenül a használat után enyhén égető érzést vált ki. Túlérzékenységi reakciót is kiválthat. Az esetlegesen előforduló mellékhatásokról, vagy más, szokatlan tünetek megjelenéséről tájékoztassa az orvosát vagy gyógyszerészét.

Összetétel:

Carmellosum natricum (karmellóz-nátrium) 3 mg/ml

Segédanyagok: Polysorbatum 80 (poliszorbát 80), Hydroxypropylbetadexum (hidroxipropil-betadex), Alfa-tocopherylisacetat (alfa-tokoferol-acetát – E-vitamin), Natriichloridum (nátrium-klorid), Macrogolglycerolihydroxystearas (makrogol-glicerol-hidroxisztearát), Vitaminum A (A-vitamin), Borax (bóráx), Dinatriedetasdihydricus (dinátrium-edetát-dihidrát), Benzalkoniichloridum (benzalkónium-klorid), Aqua ad iniectionem (injekcióhoz való víz)

Hogyan tárolja a SENSIVIT®-et?

A készítmény az eredeti csomagolásban legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Védje a hidegtől és a fagytól.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó.

Ne használja a készítményt a lejárató időn túl!

A lejárató idő a feltüntetett hónap utolsó napjára vonatkozik.

Figyelmeztetés:

A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejárató idő után ne használja.

A felbontott flakon tartalmát 28 napon belül használja el.

Csomagolás: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava,
Szlovák Köztársaság

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



A használati útmutató utolsó ellenőrzés dátuma: 2016. január