

SENSIVIT®

Sodná soľ karmelózy 3 mg/ml

Očná roztoková instilácia

1. Čo je SENSIVIT a na čo sa používa

SENSIVIT je prípravok so zvlhčujúcim a upokojujúcim účinkom. Roztok stabilizuje všetky tri vrstvy slz (slzného filmu) na povrchu oka. Obsahuje sodnú soľ karmelózy, ktorá svojimi vlastnosťami na povrchu rohovky a spojovky vytvára dočasný ochranný film, zvlhčuje povrch oka a stabilizuje vodnú zložku slz. SENSIVIT obsahuje vitamín A, ktorý posilňuje vnútornú (mukóznu) zložku slzného filmu a spolu s vitamínom E zlepšuje výživu rohovky a spojovky. Látky obsiahnuté v prípravku tiež posilňujú vonkajšiu (lipidovú) zložku slzného filmu.

SENSIVIT sa používa pri zníženej tvorbe slz k zvlhčeniu, ochrane a lubrikácii povrchu oka a pri stavoch spojených s príznakmi suchého oka:

- suchá keratokonjunktivitída (nedostatok slz, pálenie, rezanie, svetloplachosť, pocit cudzieho telieska v oku)
- poranenie rohovky, erózia rohovky, po operácii rohovky

SENSIVIT sa môže použiť pri všetkých stavoch, ktoré vyžadujú vytvorenie alebo posilnenie ochranného slzného filmu na rohovke a spojovke oka.

Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti od 2 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SENSIVIT

Nepoužívajte prípravok SENSIVIT:

- ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku tohto prípravku
- podávať ženám v období tehotenstva a matkám v období dojčenia
- deťom mladším ako 2 roky

Ak v súčasnosti používate aj iné očné prípravky, vo všeobecnosti sa odporúča dodržať aspoň 5 minútový interval medzi aplikáciou jednotlivých prípravkov.

3. Ako používať SENSIVIT

Ak lekár neurčí inak, aplikuje sa zvyčajne do spojovkového vaku 1 kvapka 1-3 krát denne. U detí určí dávkovanie individuálne lekár.

Po otvorení je prípravok pripravený na podanie do oka.

Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastovej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné po nakvapkaní prípravku do oka uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.

Upozornenie:

Tesne po aplikácii prípravku sa môže objaviť neostrené videnie, neodporúča sa preto asi 20 minút po aplikácii prípravku riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať vo výške. Súčasne s používaním prípravku nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky. Tvrdé kontaktné šošovky, majú byť pred nakvapkaním vybraté a môžu byť znova nasadené najskôr za 20 minút po nakvapkaní prípravku. Pri predpísanom dávkovaní je predávkovanie prakticky vylúčené.

Pri náhodnom užití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára.

4. Aké su možné vedľajšie účinky

Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie. Tiež sa môže vyskytnúť alergická reakcia.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov, alebo iných nezvyčajných reakcií hláste svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. Čo SENSIVIT obsahuje

Sodná soľ karmelózy 3 mg/ml, polysorbát 80, hydroxypropylbeta-dex, alfa-tokoferolacetát, chlorid sodný, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, vitamín A, bórax, dihydrát edetanu disodného, benzalkóniumchlorid, čistená voda

6. Ako uchovávať SENSIVIT a ďalšie informácie

Fľaštičku uchovávať v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred chladom a mrazom.

Prípravok uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatulke pri ikone presýpacích hodín. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Prípravok sa nesmie použiť po uplynutí doby expirácie. Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.

Veľkosť balenia: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava,

Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Dátum poslednej revízie textu: Apríl 2020