

# POTASSIUM-U bez konzervačních látek

oční kapky, roztok bez konzervačních látek

## 1. Co je POTASSIUM-U bez konzervačních látek a na co se používá

POTASSIUM-U bez konzervačních látek je irigační (výplachový) izotonický oční roztok, který obsahuje jodid draselný jako přídatnou látku. Je určený na kapání do očí. Jodid draselný působí v oku jako lapač volných radikálů kyslíku. Tyto vlastnosti jodidu draselného se používají na prevenci a podpůrnou léčbu exsudátů (nahromadění tkáňové tekutiny) a krvácení v oku.

Bez konzultace s oftalmologem může být použit k vypláchnutí očí, na kapání do očí nebo ve formě obkladů. Oční kapky POTASSIUM-U bez konzervačních látek s obsahem pomocné látky jodid draselný se používá jako podpůrná léčba při různých reorpčních procesech v oku (zvláště exsudátů, krvácení do sklivce a šedého zákalu různé etiologie).

POTASSIUM-U bez konzervačních látek mohou používat dospělí, mladiství i děti (s výjimkou novorozenců).

POTASSIUM-U bez konzervačních látek neobsahuje konzervační látky, proto je ideálním přípravkem pro osoby s citlivými očima.

## 2. Co potřebujete vědět předtím, než použijete POTASSIUM-U bez konzervačních látek

Nepoužívejte POTASSIUM-U bez konzervačních látek, pokud jste alergický na kteroukoliv složku tohoto přípravku (Viz část 6).

Oční kapky POTASSIUM-U bez konzervačních látek se nesmí používat také v následujících případech:

- těhotenství a kojení
- chronická hnisavá infekce kůže tváře
- hemoragická diatéza
- u pacientů s poruchou funkce štítné žlázy
- u novorozenců

Pokud používáte jiné oční kapky současně s přípravkem POTASSIUM-U bez konzervačních látek, aplikujte je 5 minut před nebo 5 minut po nakapání POTASSIUM-U bez konzervačních látek.

## 3. Jak používat POTASSIUM-U bez konzervačních látek

Přesné dávkování a trvání užívání určí lékař. Obvyklá dávka pro dospělé (včetně starších pacientů) je 1 kapka do postiženého oka 2x – 4x denně.

### Upozornění


Po nakapání přípravku se může u Vás dočasně objevit rozmazané vidění. Pokud se Vám toto přihodí, neřídte motorové vozidlo a vyhněte se obsluze strojů, dokud tyto příznaky neodezní.

### Nositelé kontaktních čoček

Pokud nosíte kontaktní čočky, měl/a byste je před aplikací POTASSIUM-U bez konzervačních látek z oka vyjmout. Po nakapání počkejte alespoň 20 minut, než si kontaktní čočky opět nasadíte.

### Upozornění před aplikací

1. Umyjte si ruce a pohodlně se posadte nebo postavte.
2. Odšroubujte z lahvičky uzávěr se závitem




3. Přidržte lahvičku kapátkem směrem dolů mezi palcem a ostatními prsty
4. Před první aplikací se doporučuje jemným stlačením lahvičky zkušebně odkápnout první kapku mimo oko, protože při silném a nerovnoměrném stlačení může roztok vystříknout ve větším objemu
5. Ukazovákem jemně stáhněte dolní víčko postiženého oka.



6. Přiblížte konec kapátka ke svému oku tak, aby se nedotkl oka ani jeho okolních oblastí.

7. Jemně stlačte lahvičku, aby se do oka dostala jen jedna kapka. Potom pusťte dolní víčko.



8. Prstem zatlačte koutek léčeného oka proti nosu. Podržte 1 minutu a mějte přitom zavřené oko.



Pro další kapku je třeba nechat nasát vzduch zpět do plastové lahvičky, aby se tato vrátila do původního tvaru. Upozorňujeme, že po stlačení lahvičky to může trvat několik sekund, než dojde k uvolnění kapky. Nestláčejte příliš silně.

9. V případě potřeby, postup opakujte i pro druhé oko.

10. Po použití oklepejte lahvičku bez toho, aniž byste se dotkli kapátka, aby se odstranil zbytek poslední kapky. To je třeba k uchování sterility kapek.



11. Bezprostředně po použití nasadte pevně uzávěr zpět na lahvičku.

#### 4. Jaké jsou možné vedlejší účinky

POTASSIUM-U bez konzervačních látek je obvykle dobře snášen. Zřídka se bezprostředně po aplikaci může vyskytnout přechodné mírné pálení.

Nekontrolovaná dlouhodobá aplikace (nadměrné dávkování) může u citlivých osob způsobit tzv. "jodizmus". Projevuje se podrážděním a zvýšeným překrvením spojivek, zvýšenou sekrecí slz, případně jako otok očních víček (Quinckeho edém) a edém slzné žlázy. Na kůži se může vyskytnout erytém, akné, dermatitida a purpura.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jakýchkoli jiných neobvyklých reakcí se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

#### 5. Co POTASSIUM-U bez konzervačních látek obsahuje

Chlorid sodný 2 mg v 1 ml, jodid draselný, thiosíran sodný, edetan disodný, hydroxid sodný, čištěná voda.

#### 6. Jak uchovávat POTASSIUM-U bez konzervačních látek a další informace

Lahvičku uchovávejte v původním papírovém obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky nebo na papírové krabici vedle symbolu přesýpacích hodin. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

POTASSIUM-U PF nepoužívejte déle jako 12 týdnů po prvním otevření lahvičky.

**Velikost balení:** 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 243 333 786

Fax: +421 243 638 743

e-mail: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)

[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)

CE 2265



Tento návod na použití byl naposledy aktualizován v březnu 2021.