

Tooteinfo, lugege hoolikalt!

OCUhyl C[®]

Naatriumhüaluronaat 1,2 mg/ml

Silmatilgad, lahus

1. Mis on OCUhyl C[®] ja milleks seda kasutatakse

OCUhyl C silmatilgad on niisutavad, rahustavad ja libestavad steriilsed silmatilgad, mis on mõeldud just tundlikele silmadele. Kuna antud silmatilgad sisaldavad hüaluroonhapet (aine, mis esineb naturaalselt silmas ja mujal organismis), leevendavad **OCUhyl C** silmatilgad efektiivselt ja pikaajaliselt kuivust ja kipitustunnet või silmade väsimusest tingitud ebamugavustunnet. Lisaks on **OCUhyl C** silmatilgad rikastatud loodusliku saialilleekstraktiga, mis kaitseb silmi ärrituse eest ja aitab silma epiteelil taastuda. **OCUhyl C** silmatilgad ei sisalda säilitusaineid ega antimikroobseid lisandeid. Seetõttu sobivad **OCUhyl C** silmatilgad ka inimestele, kellel on tundlikud silmad või kes kannavad kontaktläätsi. **OCUhyl C** silmatilkasid võivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed.

OCUhyl C silmatilgad on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks. **OCUhyl C** silmatilkasid kasutatakse täiendava ravina vähenenud pisaratekke korral, võõrkehade korral silmas, silma väsimuse või ärrituse korral. Silmatilku võib ka kasutada kaitsva kelme toetamiseks silma sarv- ja sidekesta pinnal. **OCUhyl C** silmatilkasid võib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

2. Mida peab teadma enne OCUhyl C[®] kasutamist

OCUhyl C silmatilkasid ei tohi kasutada:

Patsiendi ülitundlikkuse korral toote toimeaine või abiainetega suhtes.

Juhul kui **OCUhyl C** silmatilkadega kasutatakse samaaegselt ka teisi silmatilku, tuleb **OCUhyl C** silmatilku tilgutada silma viimasena ja vähemalt 5 minutit pärast muude tilkade kasutamist. Teie arst peaks olema informeeritud kõikidest retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida Te hetkel kasutate, hiljuti kasutasite, või kavatsete kasutama hakata. Kui Te kasutate ka muid silmapreparaate, peaksite arutama nende üheaegse kasutamise sobivust silmaarstiga.

3. Kuidas OCUhyl C[®]-d kasutada

Kui Teie arst ei ütle Teile teisiti, siis **OCUhyl C** silmatilku tilgutatakse tavaliselt silma konjunktivaalkotti 1 tilk 1–3 korda päevas, kuid seda võib kasutada ka tihedamini. Kasutamine lastel on individuaalne ja selle otsustab arst.

OCUhyl C silmatilkasid tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed.

Kasutusviis:



1. Võtke plastpudel koos korgiga pakendist välja.



2. Enne esmakordset kasutamist eemaldage korgilt kaitseriba.



3. Eemaldage kork



4. Kallutage pea tahapoole.

Hoidke pudelit suunaga allapoole põidla ja teiste sõrmede vahel. Tõmmake sõrmega kergelt probleemse silma alumist silmalaugu allapoole, tilgutage silma ettenähtud kogus tilku ja sulgege aeglaselt silm, et **OCUhyl C** leviks ühtlaselt üle silma pinna.

Kasutamise ajal ei tohi tilguti ots puutuda vastu silma ega silmalaugu. Et vältida võimalikku tilguti otsa saastumist, asetage pudeli kork pärast kasutamist korralikult tagasi tilguti otsa.

Hoiatus kasutamisel:

Enne esimest kasutuskorda on soovitatav tilgutada esimene tilk lahust silmast välja poole. Tugev ja ebaühtlane pudelile vajutamine võib põhjustada lahuse joana väljumise. Seda on vaja teha vaid enne esmakordset kasutamist, pärast pudeli esmast avamist.

Järgmiste tilkade tilgutamiseks laske õhul tagasi pudelisse tungida, kuni pudel on tagasi saanud oma algse kuju ning seejärel tilgutage järgmine tilk.

Vahetult pärast toote kasutamist võib patsient tajuda nägemise ähmasust. Seetõttu ei ole pärast toote manustamist umbes 20 minuti jooksul soovitatav juhtida mootorsõidukit, töötada masinatega ega töötada kõrgustes.

Juhul kui **OCUhyl C** silmatilku on kogemata laps alla neelanud, pöörduge kohe oma arsti poole.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Harva võib patsient tunda vahetult pärast ravimi silma tilgutamist ajutist, mõõdukat kipitust. Esineda võib ka allergiline reaktsioon.

Antud kõrvaltoimete või teiste ebatavaliste reaktsioonide esinemise korral konsulteerige oma arstiga.

5. Mida **OCUhyl C**® sisaldab

Naatriumhüaluroonaat 1,2 mg/ml

Lisaained: saialilleekstrakt, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, kaltsiumkloriidihüdraat, magneesiumkloriidheksahüdraat, naatriumatsetaatrihüdraat, naatriumtsitraat, süstevesi.

6. Kuidas säilitada **OCUhyl C**®-d ja muu informatsioon

Säilitage toodet temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte säilitada külmkapis/sügavkülmas.


Hoida lastele kättesaamatus kohas.

OCUhyl C silmatilku ei tohi kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja möödumist.

Pudeli sisu võib kasutada 3 kuu jooksul pärast avamist.

Ärge kasutage toodet pärast kehtivusaja lõppemist, mis on märgitud ümbrise sildil või kartongpakendil liivakella kujutise kõrval. Aegumiskuupäev viitab viimasele päevale antud kuul.

Pakendi suurus: 1 × 10 ml



UNIMED PHARMA spol s.r.o., Bratislava, Slovaki Vabariik

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu

CE 2265 STERILE A

Tekst viimati uuendatud: juuli 2016